

Incidence de l'infection nosocomiale chez les nouveau-nés

31 762 bébés



281 I.N.

= 0,88 %

- **132 conjonctivites (47 %)**
- **67 infections cutanées**
(52 cochées inf. générales)

mais...

Rappels

Prévention des conjonctivites

- MAINS +++
- collyre en dose unitaire
 - ophtadose
 - rifadine

INTERDIT → FLACON COLLECTIF

Prévention des infections cutanées

- **MAINS +++**
- **MASQUE si rhume...**
- **Nettoyage - désinfectant**
 - **table à langer**
 - **pèse-bébé**
 - **table d'examen**
entre 2 bébés
même avec papier

Exemples de bébés cochés à tort « infections générales »

- risque infectieux...**
- infection materno-foetale...**
- prélèvements « périphériques » à la naissance positifs à E coli, Sta aureus...**

Autres interdits absolus

- poire à aspiration
- le test de Guthrie, les « dextros » ne peuvent être faits par l'A.P.
- la paire de ciseaux de l'épisiotomie ne peut servir pour la section du cordon = il faut au minimum 3 paires de ciseaux (1 accouchée - 2 → bébés)

Soins du cordon

Interdits

- crayon $\text{NO}_3 \text{ Ag}$ (nitrate d'argent)
- éosine à l'eau : ce n'est pas un antiseptique