

**JOURNEE MATER DU 20 NOVEMBRE 2003**  
**Dr ROUSSOULY**

**ROLE DU PEDIATRE EN MATERNITE**

**I. CONFRONTE QUOTIDIENNEMENT AUX INFECTIONS**

On sépare :

**→ Infections Materno Fœtales = IMF**

Streptocoque B.

Herpès

E. Coli

VIH

Listeria

Hépatites

**→ Infections Nosocomiales**

Staphylocoque doré

Herpès

Autres virus

**II. EVITER QUE CET EVENEMENT HEUREUX SE TRANSFORME EN  
DRAME**

## ROLE D'ANTICIPATION

### Connaître dossier obstétrical pour évaluer le risque d'infection

Grossesse = sérologies  
PV (recherche spécifique)

Accouchement = conditions

➔ Reconnaître situations de risque d'infection Materno Fœtales

➔ Prise en charge précoce du nouveau-né : PROTOCOLES en cas de risque

- Examen clinique
- Examens Bactériologiques et Biologique

NOUVEAU-NE	MERE
Liquide gastrique Hémoculture (PL) NFP-CRP (12 <sup>ème</sup> heure)	P. Vaginal P. Gorge Hémoculture CBU

- Traitement antibiotique après prélèvements
- Poursuivre surveillance par A.P.
- Adapter ATB selon résultats

➔ Evaluer protocoles :

Ne pas développer ANTIBIO RESISTANCE

➔ Cas particuliers

Hépatite B : Sero vaccination

VIH : traitement NN

➔ Toujours penser à l'infection

- Devant des signes « minimes », généraux pouvant annoncer Septicémie – méningite
- Devant des signes localisés
  - Folliculite
  - Conjonctivite
  - Arthrite de hanches
  - Sous maxillite
  - Abcès du sein

= LA CONFIRMER PAR PRELEVEMENT

- Mère – enfant
- Personnel médical – para médical
- Lieu

= ISOLER MERE ET ENFANT

## ROLE PREVENTION

### INTERVENTION DANS LA CONCEPTION DES MATERNITES

- Poste de lavage des mains facile d'accès, distribution de produit de friction
- Circuits du linge
- Eviter regroupement des NN.
- Matériel (berceau...) facile d'entretien
- Exiger du matériel à usage unique
- Prélèvements (Epicranienne + seringue)
- Soins cordon et toilette
  - o Diminuer / supprimer transmission manu portée ou autres
- Supprimer bijoux
- Attention aux poches
- Désinfecter plan d'examen/ruban/toise
- Lavage des mains et frictions
  - o Avant et après toute intervention
- Si infection, port du masque – sarrau à usage unique
- Essayer de limiter les visites

## RELATION AVEC CLIN

### En cas d'infection

= Recueil des données bactériologiques

« Heure de vérité »

= Demander prélèvements

- Mère – enfant
- Points sensibles (eau, couverture)
- Personnel = Rhinopharynx

But : Typage du germe

Montrer qu'il y a eu rupture « Chaîne d'hygiène »

**NECESSITE D'UNE GRANDE MOTIVATION DE TOUS**