

Promouvoir l'asepsie en maternité

Raphaële Girard
Unité d'Hygiène et Épidémiologie
CH Lyon Sud

Le réseau MATER SE
vous propose
3 affiches :

toucher vaginal (après rupture)
révision utérine
suture d'épisiotomie


Toucher vaginal après rupture des membranes

Geste à haut risque infectieux, à limiter



- **Toilette vulvopérinéale**
avant le 1^{er} toucher vaginal
- **Antisepsie vulvovaginale**
avant chaque toucher vaginal

*Gamme Povidone
type Bétadine®*



- **Ni montre, ni bijoux**
- **Masque**
- **Désinfection des mains**
par friction ou par lavage
- **Gants stériles aux deux mains**

Promouvoir l'asepsie en maternité Réseau Mater Sud-Est

Pour en savoir plus : "Guide Maternité SFHH"
http://www.sfh.net/telechargement/recommandations_guidematernite.pdf

C.CLIN SUD EST
Centre hospitalier Lyon Sud - Pavillon 1M - 69495 Pierre-Benite Cedex
cclinse@chu-lyon.fr




Révision utérine

Geste à haut risque infectieux et
à risque d'AES



- **Toilette vulvopérinéale**
- **Antiseptie vulvovaginale**
- **Champs stériles**

*Gamme Povidone
type Bétadine®*



- **Tenue chirurgicale** : Sarrau stérile, masque et lunettes de protection ou masque à visière
- **Désinfection chirurgicale des mains**
par friction ou par lavage
- **Gants stériles spécifiques pour révision utérine**



- **Collecteur** à portée de main et de vue

Promouvoir l'asepsie en maternité Réseau Mater Sud-Est

Pour en savoir plus : "Guide Maternité SFHH"
http://www.sfh.net/telechargement/recommandations_guidematernite.pdf

C.CLIN SUD EST
Centre hospitalier Lyon Sud - Pavillon 1M - 69495 Pierre-Benite Cedex
cclinse@chu-lyon.fr




Suture d'épisiotomie

Geste à haut risque infectieux et à risque d'AES



- Toilette vulvopérinéale
- Antiseptie vulvovaginale
- Champs stériles

Gamme Povidone
type Bétadine®



- Tenue chirurgicale : Sarrau stérile, masque et lunettes de protection ou masque à visière
- Désinfection chirurgicale des mains par friction ou par lavage
- Gants stériles



- Instrumentation stérile « spéciale épisiotomie »



- Collecteur à portée de main et de vue

Promouvoir l'asepsie en maternité Réseau Mater Sud-Est

Pour en savoir plus : "Guide Maternité SFHH"
http://www.sfhh.net/telechargement/recommandations_guidematernite.pdf

C.CLIN SUD EST
Centre hospitalier Lyon Sud - Pavillon 1M - 69495 Pierre-Benite Cedex
cclinse@chu-lyon.fr



Pour quel usage ?

- Réponse à une situation qui le nécessite
 - Décelée par la surveillance des IN
 - Observée ...
- Sensibilisation systématique
 - Équipe
 - Stagiaires.....

Répondre à un besoin (1)

- Plus d'infections (endométrites par exemple) **observées** que d'infections **attendues**
- D'après le rapport annuel 2003
- Ou selon l'affiche de juin 2005

Répondre à un besoin (2)

- Des pratiques de soins à risque **observées** différentes des soins **attendus (protocole)**
- D'après les observations de terrain

Quelles cibles

- Gestes : des gestes répétés, pour lesquels le consensus est clair
- Points critiques : l'affiche ne reprend que les points incontournables
 - Pour le risque IN
 - Pour le risque AES

Toucher vaginal après rupture des membranes

Geste à haut risque infectieux, à limiter



- **Toilette vulvopérinéale** avant le 1^{er} toucher vaginal
- **Antiseptie vulvovaginale** avant chaque toucher vaginal

Gamme Povidone
type Bétadine®



- **Ni montre, ni bijoux**
- **Masque**
- **Désinfection des mains** par friction ou par lavage
- **Gants stériles aux deux mains**

Promouvoir l'asepsie en maternité Réseau Mater Sud-Est

Pour en savoir plus : "Guide Maternité SFHH"
http://www.sfhh.net/telechargement/recommandations_guidematernite.pdf

C.CLIN SUD EST
Centre hospitalier Lyon Sud - Pavillon 1M - 69495 Pierre-Benite Cedex
cclinse@chu-lyon.fr




Révision utérine

Geste à haut risque infectieux et à risque d'AES



- **Toilette vulvopérinéale**
- **Antiseptie vulvovaginale**
- **Champs stériles**

Gamme Povidone
type Bétadine®



- **Tenue chirurgicale** : Sarrau stérile, masque et lunettes de protection ou masque à visière
- **Désinfection chirurgicale des mains** par friction ou par lavage
- **Gants stériles spécifiques pour révision utérine**



- **Collecteur** à portée de main et de vue

Promouvoir l'asepsie en maternité Réseau Mater Sud-Est

Pour en savoir plus : "Guide Maternité SFHH"
http://www.sfhh.net/telechargement/recommandations_guidematernite.pdf

C.CLIN SUD EST
Centre hospitalier Lyon Sud - Pavillon 1M - 69495 Pierre-Benite Cedex
cclinse@chu-lyon.fr



Suture d'épisiotomie

Geste à haut risque infectieux et à risque d'AES



- **Toilette vulvopérinéale**
- **Antiseptie vulvovaginale**
- **Champs stériles**

Gamme Povidone
type Bétadine®



- **Tenue chirurgicale** : Sarrau stérile, masque et lunettes de protection ou masque à visière
- **Désinfection chirurgicale des mains** par friction ou par lavage
- **Gants stériles**



- **Instrumentation stérile** « spéciale épisiotomie »



- **Collecteur** à portée de main et de vue

Promouvoir l'asepsie en maternité Réseau Mater Sud-Est

Pour en savoir plus : "Guide Maternité SFHH"
http://www.sfhh.net/telechargement/recommandations_guidematernite.pdf

C.CLIN SUD EST
Centre hospitalier Lyon Sud - Pavillon 1M - 69495 Pierre-Benite Cedex
cclinse@chu-lyon.fr



Une politique complète Pour une efficacité maximale

Un protocole écrit, validé

Une pratique conforme au protocole

Pas plus d'infections
observées qu'attendues

Une politique préventive Pour une efficacité maximale

Un protocole révisé, consensuel

Une formation

Pas plus d'infections
observées qu'attendues

Une pratique
évaluée conforme

La diffusion prévue

- Reprend la diffusion de « *Materlien* »
- Priorité aux maternités du réseau
 - Chef de service
 - Sages femmes cadres
 - Référents
 - Unité d'hygiène de soutien...
- Diffusion aussi aux autres maternités de l'inter-région
- Envois sur demande...

Conclusion

- Un outil
- Qui peut aider, en sollicitant l'attention
- Mais qui ne fera pas « tout tout seul »!