

**Accouchées par Césarienne**  
**Résultats 2004**  
**Réseau Mater CCLIN Sud-Est**

*Catherine HAOND*

# Description des patientes

- 7587 césariennes soit 19,6 % des femmes
  - prophylactique : 52,9% (4012)
  - non programmées: 46,9% (3556)
- Age moyen = 30,8 ans
- Parité moyenne = 1,83
- Durée séjour post-accouchement : 6,4 j (ET = 1,8)

## **Facteurs de risque non spécifiques chez les accouchées par césarienne**

<b>Facteurs de risque</b>	<b>Césarisées n</b>	<b>Césarisés %</b>
Infection urinaire pendant la grossesse	392	5,3
RPM $\geq$ 12h	239	3,2
Perte de sang $>$ 800 ml	288	3,8
Hyperthermie du travail	194	2,6
Infection urinaire à l'entrée	106	1,5

## Facteurs de risque chez les accouchées par césarienne

	Césarisées (n)	Césarisées (%)
Césarienne prophylactique	4 012	52,9
1ère césarienne	4 973	65,5
ATB P	6 294	83,0
Anesthésie G	639	8,4
Sonde à demeure	7 431	97,9

# Evolution des facteurs de risque

- De 1997 à 2000: diminution significative du taux
  - hyperthermie du travail
  - rupture prématurée des membranes
  - anesthésie générale
- De 2000 à 2004:
  - baisse du taux anesthésie générale de 13,1 à 8,4%
  - baisse du taux antibioprophylaxie → 2003 (85,5%) puis 83% en 2004

## Infections chez les accouchées par césarienne

- 3,3 % (249/ 7 506) des femmes accouchant par césarienne ont présenté au moins une I.N. (*3,6 en 2003*)
- 3,56 % (267/ 7 506) d'infections nosocomiales pour 100 accouchées par césarienne. (*3,7 en 2003*)
- Le délai moyen d'apparition des IN = 6 jours. (*6,5 en 2003*)

## Taux d'infections chez les accouchées par césarienne

Sites	Accouchées par césarienne	
	Effectifs*	Fréquence relative(%) N=7 506
Bactériémies	12	0,16
Endométrites	20	0,27
Infections urinaires	91	1,21
Infections du site opératoire	91	1,21
Dont superficielles	77	1,03
profondes	7	0,09
Type inconnu	7	0,09
Infections locales sur cathéter	10	0,13
Infection du sein	6	0,08
Syndromes infectieux non étiquetés	37	0,49
<b>Total</b>	<b>267</b>	<b>3,56</b>

\* Une même patiente peut avoir plusieurs sites infectés


# Patientes infectées et Facteurs de risque

Facteurs de risque	n	% infectées
Accouchement par césarienne	249/7506	3,3
Hyperthermie au travail	15/191	7,9
RPM $\geq$ 12h	20/235	8,5
Perte de sang $>$ 800 ml	10/283	3,5
Césarienne sans antibioprophylaxie	53/1 249	4,2
Césarienne après début du travail	128/3 508	3,6

## Durée du séjour post-accouchement

- Durée Moyenne Séjour = 6,4 j (ET = 1,8)
  - Césarisées non infectées = 6,3 j (ET = 1,8)
  - Césarisées infectées = 7,8 j (ET = 3,1)

## Délai moyen d'apparition des IN chez les femmes accouchant par césarienne



# Infections Nosocomiales apparues après la sortie

