


Surveillance des accouchées par voie basse Année 2004



Réseau Mater Sud-Est
Dr Agnès Vincent





- Du 1 janvier au 31 décembre 2004 :
 - 31055 femmes accouchées par voie basse (AVB) ont été incluses dans la surveillance
 - Soit 80% des accouchements inclus
- L'âge moyen des femmes accouchées par voie basse est de 29,7 ans
 - Âge moyen des césarisées : 30,8 ans
- La parité moyenne est de 1,9
 - Parité moyenne des césarisées : 1,8 ans

Facteurs de risque non spécifiques




- **Infection urinaire pendant la grossesse :**
1484 femmes - 4,9% des AVB inclus
- **Infection urinaire à l'entrée :**
311 femmes - 1,1% des AVB inclus (mais 5% de valeurs manquantes...)
- **Hyperthermie du travail :**
623 femmes - 2% des AVB inclus

Facteurs de risque non spécifiques



- **Rupture prématurée des membranes >12h avant hospitalisation :**
997 femmes – 3,2% des AVB
- **Perte de sang >800ml :**
805 femmes – 2,6% des AVB

Facteurs de risque spécifiques



- **Péridurale :**
20300 femmes – 65,4% des AVB
- **Délivrance artificielle / Révision utérine :**
2974 femmes – 9,6% des AVB
- **Manœuvres extractives instrumentales :**
4045 femmes – 13% des AVB

Facteurs de risque spécifiques



- **Touchers vaginaux >5 après ouverture de l'œuf :**
10565 femmes – 34% des AVB
- **Déclenchement :**
5882 femmes – 18,9% des AVB
- **Antibioprophylaxie streptocoque B :**
5356 femmes – 17,2% des AVB

Facteurs de risque spécifiques



- **Sondages évacuateurs**


- Aucun sondage évacuateur : 13106 femmes – 42,2% des AVB
- De 1 à 3 sondages : 17877 femmes – 57,6% des AVB
- Plus de 3 sondages : 72 femmes – 0,2% des AVB



Les infections acquises

- 287 femmes accouchées par voie basse ont développé au moins une infection nosocomiale
- Taux d'infectées : 0,93% (287/30883) des AVB
→ Chez 172 AVB l'item infection acquise était inconnu
- Taux d'infections : 0,99% (305/30883) des AVB

Répartition des infections acquises chez les accouchées par voie basse




Délai d'acquisition des infections



- Durée moyenne de séjour post-accouchement des AVB :
 - sans infection acquise 4,2 jours
 - avec au moins une infection 5,5 jours

Infections apparues après la sortie



- **Pour 21% (60/287) des patientes infectées le diagnostic d'IN a été posé après leur sortie.**
- 74% (14/19) des infections du sein recueillies ont été diagnostiquées **après la sortie de l'accouchée.**
- De même que 28% (17/60) des ISO, 27% (15/55) des endométrites, 11% (11/104) des infections urinaires.



Conclusion

- Les infections nosocomiales chez les accouchées par voie basse sont une réalité.
- La surveillance permet d'en être conscient et de maintenir la vigilance des soignants en éveil.
- *Merci à tous pour le travail de surveillance quotidien fourni sans lequel ce réseau n'existerait pas*