



Surveillance des accouchées par voie basse Année 2005




Réseau Mater Sud-Est
Dr Catherine Haond






- Du 1 janvier au 31 décembre 2005 :
 - 32 023 femmes accouchées par voie basse (AVB) ont été incluses dans la surveillance
 - Soit 80% des accouchements inclus
- L'âge moyen des femmes accouchées par voie basse est de 29.6 ans
 - Âge moyen des césarisées : 30.7 ans
- La parité moyenne est de 1.9
 - Parité moyenne des césarisées : 1.8
- L'âge gestationnel moyen est de 39.3
 - 38.6 pour les césarisées

Facteurs de risque non spécifiques




- **Infection urinaire pendant la grossesse :**
2024 femmes – 5,1% des AVB inclus
- **Infection urinaire à l'entrée :**
408 femmes - 1,1% des AVB inclus
- **Hyperthermie du travail :**
813 femmes – 2,1% des AVB inclus

Facteurs de risque non spécifiques




- **Rupture prématurée des membranes ≥ 12 h avant hospitalisation :**
2537 femmes – 8% des AVB
- **Perte de sang > 800 ml :**
1439 femmes – 3,7% des AVB

Facteurs de risque/Facteurs protecteurs spécifiques




- **Péridurale / Rachianesthésie**
21 846 femmes – 68,2% des AVB
- **Délivrance artificielle / Révision utérine :**
3 665 femmes – 11,5% des AVB
- **Manœuvres extractives instrumentales :**
3 868 femmes – 12,1% des AVB

Facteurs de risque/Facteurs protecteurs spécifiques




- **Touchers vaginaux >5 après ouverture de l'œuf :**
10 903 femmes – 34,1% des AVB
- **Déclenchement :**
6 312 femmes – 19,7% des AVB
- **Antibioprophylaxie streptocoque B :**
3 992 femmes – 12,5% des AVB

Facteurs de risque/Facteurs protecteurs spécifiques



- **Autre antibioprophylaxie**
4 643 femmes – 14,5% des AVB
- **Episiotomie**
20 701 femmes – 65,6% des AVB



Facteurs de risque spécifiques

- **Sondages évacuateurs**

- **1 sondage évacuateur :**

- 15 099 femmes – 47,2% des AVB

- **2 sondages évacuateurs :**


- 3 914 femmes – 12,2% des AVB

- **3 sondages évacuateurs :**

- 625 femmes – 2,0% des AVB

- **Plus de 3 sondages évacuateurs :**


- 99 femmes - 0,3% des AVB




Les infections acquises

- 287 femmes accouchées par voie basse ont développé au moins une infection nosocomiale
- Taux d'infectées : 0,90% (287/32023) des AVB
- Taux d'infections : 0,94% (302/30883) des AVB

Répartition des infections acquises chez les accouchées par voie basse




Séjour post-accouchement




- Durée de séjour post-accouchement
 - 4,8 jours (mini 0 – maxi 26)
(césarienne 6,2 jours - mini 0 – maxi 27)

Délai moyen d'apparition des IN



Infections apparues après la sortie



- **Pour 19,5% (56/287) des patientes infectées le diagnostic d'IN a été posé après leur sortie.**

Infections Nosocomiales apparues après la sortie

