

# PRECAUTIONS « STANDARD »

## Les 7 « standard » capitaux




### ❖ Hygiène des mains

- Avant et après tout contact avec un patient ou son environnement proche
  - Je fais un lavage simple des mains si elles sont souillées
  - Je fais une désinfection si elles sont visuellement propres
- Après le retrait des gants, entre deux activités, entre deux patients

### ❖ Port de gants

- Si risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques (selles, urines, crachats...), notamment lors de soins à risques de piqûres (pose de cathéters, hémocultures, injections...) et lors de la manipulation de linge ou surfaces souillées
- Si les mains des soignants comportent des lésions




### ❖ Port de tabliers plastiques, et/ou masque et/ou lunettes

- Pour se protéger du risque de projection ou d'aérosolisation de sang lors de soins à risques (intubation, aspirations, endoscopie...)
- Pour préparer les produits d'entretien

### ❖ Prévention des accidents expositions au sang

- Ne **JAMAIS** recapuchonner les aiguilles
- Ne pas désadapter à la main
- Jeter immédiatement dans la boîte jette aiguille au plus près du soin.
- Mettre des gants en latex
- Ne pas remplir la boîte au-delà de la limite




### ❖ Nettoyage des surfaces souillées

- Nettoyer toutes surfaces souillées par du sang ou des liquides biologiques avec le détergent désinfectant de « surfaces »

### ❖ Transport des prélèvements biologiques, linge souillé, déchets

- Doivent être transportés dans un emballage fermé et étanche



### ❖ Si contact avec du sang ou des liquides biologiques

- Après piqûre, blessure : lavage et antiseptie de la plaie
- Après projection sur les muqueuses : rinçage abondant
- Contacter la médecine du travail